

Dyston

Batch No.

Celebrate beauty
Celebrate Life



در صورت وجود هرگونه سوال با واحد حمایت از بیماران
شرکت آترا زیست آرای تماس بگیرید.

۰۹۴۲۶۰۰۱۵۱۶ (داخلی صفر)

• برای اطلاع از طرح‌های تشویقی ویژه مصرف‌کنندگان
ما را در اینستاگرام دنبال کنید. @dyston.official



Dyston
[Botulinum Toxin Type A]

مراقبت های پس از تزریق

- ایجاد تورم و کبودی خفیف در محل تزریق امری طبیعی است. این عارضه موقتی است و معمولاً پس از چند ساعت برطرف می شود. برای پیشگیری از تورم و کبودی می توانید از کمپرس یخ استفاده کنید.
- تا ۲۴ الی ۴۸ ساعت بعد از تزریق، محل تزریق را ماساژ ندهید.
- تا ۴۸ ساعت پس از تزریق، دراز نکشید و خم نشوید.
- پس از تزریق به مدت یک ساعت عضلات تحت تأثیر را با منقبض و منبسط کردن همان ناحیه (بدون دخالت دست) نرمش دهید تا مواد تزریق شده سریع تر جذب شوند.
- تا ۲۴ ساعت پس از تزریق از انجام فعالیت های شدید و ورزش، که منجر به تعریق شود خودداری کنید.
- از رفتن به مکان های گرم و حمام آب داغ تا یک روز پس از تزریق پرهیز کنید.
- از انجام هر گونه اعمال درمانی و زیبایی اعم از لایه برداری، ماساژ، میکرودرم ابریژن و ... تا دو هفته پس از تزریق خودداری کنید.
- در صورت قرار گرفتن زیر نور خورشید حتماً از ضد آفتاب استفاده کنید.
- مدت ماندگاری اثر بوتولینوم نوروکسین (دیستون) می تواند بین ۲٫۵ تا ۵ ماه (بر اساس شرایط فیزیولوژیک فرد) باشد.
- اثرات تزریق ممکن است تا دو هفته کامل نشود. پس از این مدت می توانید برای ارزیابی و تزریق مجدد به پزشک مراجعه نمایید.